



دانشگاه علوم پزشکی لرستان  
بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدهشت

## واکسیناسیون



تهیه کننده: سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام خمینی (ره)  
شهرستان کوهدهشت  
تابستان ۱۳۹۰

قطره استامینوفن پیش از واکسیناسیون

می تواند کمک کننده باشد.

تعداد قطره = دو برابر وزن نوزاد

مثلا اگر نوزاد ۶ کیلو است ، باید ۱۲

قطره استامینوفن بدهیم .

**منبع:**

اینترنت ، پایگاه اطلاع رسانی پرستار و پرستاری

گاهی بعد از تزریق نوزاد تب می کند برای

بائین آوردن آن می توانید از قطره

استامینوفن استفاده کنید

گاهی برخی از نوزادان در طی یک تا دو

روز بعد از واکسن کمی بی اشتها می شوند

و گریه و بی تابی می کنند، این موارد

زودگذر هستند



## واکسن ب ت ژ (سل):

حدود یک الی دو ماه بعد بصورت جوش  
بزرگ شده و سرانجام سرباز می کند این  
موارد مانعی برای شستن و حمام کردن  
شیرخوار نیست مواردی چون سرماخوردگی ،  
زردی خفیف، اسهال مانع زدن واکسن نمی  
شود. اما بهتر است در تمام موارد فوق با  
پزشک متخصص کودکان مشاوری کنید .



در کشور ما نوزادان بعد از تولد علیه  
بیماریهای فلج اطفال ، هپاتیت ب ، سل ،  
کزاز ، دیفتیری ، سیاه سرفه و اوریون  
واکسینه می شوند.

در نوزادان نارس معیار ، سن تقویمی  
برای انجام واکسیناسیون می باشد و  
شروع برنامه ایمن سازی همانند دیگر  
کودکان است .

واکسن هپاتیت ب : گاهی توده کوچکی  
در محل تزریق ایجاد می کند که هنگام  
لمس دردناک است بعد از چند دقیقه این  
توده از بین خواهد رفت.

قرمز شدن و دردناک بودن نشانه عفونت  
نیست و می توانید از حوله گرم به مدت  
دو الی سه روز برای از بین بردن این  
علائم کمک بگیرید .

## برنامه واکسیناسیون کودکان ایران

بدو تولد	ب ت ژ-هپاتیت ب-فلج اطفال
۲ ماهگی	هپاتیت ب-فلج اطفال-سه گانه
۴ ماهگی	فلج اطفال-سه گانه
۶ ماهگی	فلج اطفال-سه گانه-هپاتیت ب

۱۲ ماهگی	MMR
۱۸ ماهگی	فلج اطفال-سه گانه
۴-۶ سالگی	فلج اطفال-سه گانه- MMR

MMR = سرخک ، سرخچه ، اوریون

